

# QUÆSTIO MEDICA,

*Quodlibetariis disputationibus manè discutienda in Scholis  
Medicorum, die Lunæ 18. Januarii 1712.*

M. NICOLAO ANDRY, Doctore Medico,  
Lectore & Professore Regio, Præside.

*An Erumpentibus Variolarum ἐκθύματα, à Phlebotomiâ, & purgatione semper abstinendum?*

## I.

**C**OMMUNI ἐκθύματων atque ἐκθύματων nomine, cutaneas quasvis efflorescentias, seu extimam cutis superficiem duntaxat attingentes, seu in ipsâ sublimis indiscriminatim appellarunt nonnulli veterum *A*, usus tamen obtinuit *B* ut ἐκθύματα proprie dicantur quæ cutem tantùm maculis fœdant, ut Petechiæ seu Papulæ, peculiari appellatione, purpura nuncupatæ, quarum Hippocrates, Galenus, Aëtius, meminerunt *C*: ἐκθύματα verò quæ eam præterea attollunt, in quibus numerantur Morbilli & Variolæ, veteribus Græcis & Latinis haud incogniti morbi *D*, licet peculiarem de iis mentionem non fecerint, ut pote quos inter malignarum febrium accidentia duntaxat recenserent, subque generali ἐκθύματων, aut ἐκθύματων, vocabulo, criticè quidem erumpentium, nec proprium & peculiare morbi genus constituentium, comprehenderent *E*, ita ut indicatâ febrium curatione, illorum curam particularem habendam esse haud existimarent. Variolæ itaque, quas ab antiquiori causâ, nempe à sanguinis materni inquinamenti ortas, opinati sunt Arabes *F*, proindeque nec novum *G* censuerunt esse morbum qui ut vulgò & minus aptè creditur, ab iis circiter temporibus quibus eas descripsere *H*, in orbem effundi cœptus sit: ἐκθύματα sunt epidemicè, ut plurimum, certisque quibusdam annis, vere *I* præsertim irrupentia, quæ vix quisquam per vitæ curriculum declinat; pueros potissimum infestantia, nonnunquam adultos, quin & senes (ut hisce temporibus contigit, ubi non nullos ultra decem & sexaginta annis natos, hoc morbo affectos, tandemque feliciter restitutos vidimus) nec semel tantum, ut fere fit, sed quandoque secundo, tertio quarto, &c. eundem invadentia, febris ut plurimum continuæ, aliquando intermittenti supervenientia *K*, tumque rubentia primum, varorum magnitudine (undè & Variolarum *L* nomen) confertim in corporis superficie, ac præsertim in facie, manibus, pedibusve erumpentia, mox intra aliquot dies suppurantia, & in crustas tandem abeuntia, aliquando foveis in cute relictis, aliquando nullis: funesta plerumque si segnitè erumpant, nunquam verò non lethalia si semel enata retrocedant aut quiescant, ut referente Hippocrate *M*, contigit Tymonædis filio bimestri, cui pustulæ in cruribus, coxis, lumbis, & imo ventre, rubicundæ effloruerunt, quæ postea conquieverunt, tumque convulsiones & mortem acceperunt: item ægroto adulto, vigesimum jam annum agente, sileno dicto, cujus morbum ita exponit sedulus ille observator, ut præcipua Variolarum & cum eruptione sunt, & male tandem erumpunt, Symptomata fusè & dilucidè describit, qui silenus octavo vehementissimæ febris die, sudore per totum corpus, diffusus est, cum pustulis rubentibus, rotundis, parvis, varorum *N* speciem referentibus, quæ consistentes, nec amplius crescentes, undecimo tandem die, cum ægrotante, qui tùm è vivis excessit, evanue-

A Hipp. 5. epid.  
sect. 3.  
Cosc. præn. 444  
Aëtius. lib. 1.  
meth. med. c. 104  
alique.  
B Galen. 3. in 54  
epid. com. text.  
51.

Fern. alique  
quam plures.  
C Hipp. 1. epid.  
sect. 2. statu 2.  
Idem 4. epid. in  
fine. 5. epid. ver-  
sus fuem. 7. epid.  
ad calcem.  
Aëtius lib. 5. c. 129.  
Aëtius. lib. 1.  
meth. cap. 23.

D Hippocrati,  
Galen. Aëtio, hic  
verò de pustulis  
puerorum ac per  
torandis loquitur  
lib. 14. cap. 63.  
E Ant. Merin-  
d. de febr. cap.  
ult.

River. meth. cur.  
febr. sect. 3. c. 2.  
alique optimè  
notæ medici, id  
observant.

F Avic. lib. 4.  
sect. 1. tract. 4.  
c. 6. alii que quo-  
rum sententiam  
secuti sunt Senner-  
lib. 4. de febr. c.  
cap. 10. Duncan.  
lib. 1. cap. 8.  
River. loco cit.  
Zuinger. Theatr.  
Prax. Med. ali-  
que quàm plures.  
G River. loco  
jam cit.

H Aun. Chr.  
millefimo quin-  
gentesimo.

I Hipp. aph. 20.  
sect. 3. τὸ μὲν  
τὸ πρὸς τὴν ἐκθύ-  
ματις ἐκθύματις  
ἐκθύματις.

Vide Heurnium  
in hunc aphor.

K Ant. merind.  
de febr. cap. 10.

L Mercur. de  
morbo pueror. c. 2.

River. meth. cu.  
febr. sect. 3. c. 2.

M Hipp. 7.  
epid. versus fuem.

N Aëtius lib. 10.

A. 1. Epid. sect. 1.  
B. 3. Epid. sect. 1.  
C. Avicenn. lib. 4.  
feb. 1. tract. 4.  
cap. 8.  
Fernel. de morb.  
pestil. lib. 2. c. 12.

D. Galen. meth.  
med. lib. 5. c. 12.  
versus finem.

E. Zuinger. Theat.  
prax. med.

F. Hipp. 3. epid.  
sect. 3. cap. 1.

G. Coel. Aurel.  
de morb. acut. &  
chron. præfat.  
H. Eryd. Otomann.  
dissert. physico-  
med. dissert. 1.

I. Marr. Lister  
de humor. cap. 1.  
in scholis.

K. Vide Johan.  
Freind. Emmenol.  
sup. 3.

L. Zuinger. Theat.  
praxeos med. in  
hydrophobâ capi-  
tæ quæ quam plures  
signa observantur.

runt *A*; *indomata* illa ita aliquando luxuriant, ut non solum per totam corporis peripheriam disseminentur, sed præterea in faucibus, ore, ano, emineant, quemadmodum in quibusdam febribus, antè vernum tempus, epidemicè sævientibus, accidisse narrat Hippocrates *B*, alias pauca sunt & rara, alias rubra, cineritia, violacea, quin aliquando nigra *C*, qualia enata esse scribit Galenus, in malignâ quâdam tempestate, ubi postquàm vomuerant ægrotantes, eorumque alvus fluxerat, iis qui evasuri erant, pustulæ nigræ, toto corpore confertim erumpebant, quarum quædam sponte deinceps apertæ, in crustulas abibant, quædam non apertæ, asperæ nihilominus & scabiosæ evadebant, subque squammarum specie decidebant, quo peracto, integræ sanitati restituebantur ægrotantes *D*: Aliæ majoris pisi magnitudinem æquant, quædam miliares, figurâ rotundâ aliæ, ovali aliæ, aut irregulâri; sæpè in hemispheriis attolluntur, quandoque humiles & depressæ cernuntur: ipsi aliquandò nullæ aliæ consociantur eruptiones, aliquando verò papulæ rubræ, lividæ, aut nigræ interpositæ conspiciuntur, imo & in medio pustularum quasi clavus niger impressus nonnunquam advertitur. Si pauciores sint, albæ, latæ, probè fastigiatæ, circulo, in basi, maximè rubicundo cinctæ, cum febris remissione, tùm boni sunt ominis *E*, ægrique perfectè & citrà deformes cicatrices ac foveolâs pristinam valetudinem recuperant. Si autem pallidæ evadunt, aut nigræ, nullo circulo rubro ardente circum scriptæ, planæ magis quam sublimes, in medio acumine cavæ, tarde admodum & ægrè erumpentes, tùm semper periculosæ existunt, in primis si simul febris acuta teneat, aut petechiæ intermisceantur, neque facies, manus, pedesque in tumorem assurgant, aut si alvi fluor superveniat, ut iis contigit de quibus Hippocrates in ardentium quarundam febrium descriptione, qui similibus tuberculis simul & febre affecti, celeriter interibant cum alvi fluxus adveniret *F*. Periculosæ iterùm, imò lethales plerùmque, quibus jam apparentibus, sitis interna, frequentes horrores perseverant, quarum crustæ duræ admodum cernuntur, quæque laceratæ sanguinem magis quàm purulentam materiam fundunt: periculosæ deniq; in quibus transpiratio penè intermissa cutis texturam irrigare ac emollire nequit, periculosæ ubi aridæ omnino sunt fauces, deliria adsunt, veterinus, motus convulsivi, pulmonum angustia, præsertim si hieme contingat morbus, tùm enim licet interna perspirationis instrumenta huic promovendæ magis idonea sint *G*, undè & ærem frigidum transpirationi maximè favere asserunt multi *H*, quod & eorum voracitate qui frigidas regiones incolunt, probari posse videtur *I*, tamen propter ambientis aeris, cutem contrahentis, objectos obices, minùs integra succedit noxiarum per cutis poros deturbatio, cujus sane transpirationis defectu, seu à contractione cutis oborto, seu à minori internarum partium, robore, seu ab aliâ quacumque causâ, gravissima Variolarum symptomata exsurgunt. Hinc senibus quàm juvenibus, sæminis quàm viris, & obesioribus quàm gracilibus, periculosior ut plurimum, Variolarum affectus. In his enim quàm in illis *K* minor est sanguinis perspiratio.

## I I.

**V**ARIOLARUM fermentum, in circumeunte sanguine altius reconditum oberrat, citràque ullam sui significationem per aliquod tempus, plures aut pauciores annos perseverat, non secus ac in vino, cerevisiâ, succis plantarum, syrupis, condituris, partes fermentationi idoneæ diu delitescunt & conquiescunt, aut eadem ratione quâ virus è salivâ canis rabidi semel eructatum, menses integros, quin & plures annos *L* in vulnerati sanguine inviscatum commoratur. Fermentum autem illud sale acri salso constat, quod tandem ab externâ causâ, jugi motu, in maximo sanguinis cœtu, percitum, asperâ suâ superficie, sulphureos sanguinis globulos discerpit, ex iisque sales involutos elicit, qui in sero dissolvuntur, & globulos sanguinis magis ac magis discerpunt, quod satis testantur rubentes ut plurimum urinæ, cum è contra in sanguinis coagulatione, limpidiore aut pallidiores reddantur, ob strictiorem scilicet globulorum sibi invicem adhærentium, connexionem,

è quibus serum elicitur, quemadmodum acidi cuiusdam affusione serum lactis & parte butyrosà erumpit, *A* idque exemplo comprobatur hydropicorum qui si ineunte morbo oxymel scilliticum frequentius fumant, urinas excernunt quàm antea decoratioribus *B*. Ex hac autem globulorum sanguinis comminutione, quandoque mixtus sanguineus exoritur, quandoque etiam sanguinis profluvium per nares, alvum, renes, pulmones. Ab eadem sanguinis commotione & fermentatione, dolores capitis exurgunt, cruciatus lumborum, vomitiones, inquietudines, ardores, &c. At verò si hæc ipsa globulorum sanguineorum comminutio, & à se se invicem disgregatio perseveret, serum ferè omne ex suis claustris excitatur, foras trahitur, & tandem sanguis aliquandò exsiccatur, undè & faucibus ariditas, asperitas linguæ, sitis urens, pulmonum inflammatio, angina, aliaque id genus mala: cave enim adducaris ut credas atrociora hæc variolarum symptomata, non solum cum erupturæ sunt, sed etiam dùm erumpunt, non nunquam contingentia, à sanguine acidis coacto, potius quàm seri, partiumque volatilium jacturâ inspissato, originem ducere: enim verò sales hi falso-acres, ex acidis nempe & alkalinis fixis constari, ut vel ex eo conicere licet quod dùm cuti Variolis conspersæ inhærent, non dissilantur, sed vestigia profunda inurunt, hi inquam sales, ob majorem quàm pollent soliditatem, majori quoque dùm à corde & arteriis vibrantur, feruntur impetu, tùmque mole suâ fixâ, suisque quibus hirti sunt aculeis, sulphurearum partium stamina potentiùs dividunt & lacerant, atque hinc major sanguinis dissolutio, & tandem exsiccatio. Sales autem hi antea torpentes, ab iis primùm excutiuntur, quæ sanguinis motum intendere apta sunt, ut exercitiis immodicis, vigiliis nimis, compositionibus *C*, irâ, quin & aliquando formidine nimia, undè sæpe numero eos citius aggrediuntur variolæ qui ne ab iis corripiantur, vehementius pertimescunt; neque enim eam esse imaginationis vim tibi suadeas quæ per se morbum qui timetur, procreare *D* valeat; quemadmodum opinantur plurimi, & inter ipsos non nulli verane an absurda loquantur parùm adeo solliciti, ut hos si audias *E*, etiam alius alium quâlibet cum animi tùm corporis ægritudine afficere possit. Imaginationis quidem magnam vim esse plurima eaque lectu digna testantur exempla *F*, nec certe inficias iri potest malignos quosdam morbos, ex eorundem timore ingenti aliquando exoriri, sed ex accidenti id tantùm contingere procerto habeas, quatenus nimirum ingens hic timor pravorum humores antea in corpore genitos, & quietè latentes, seu fomitem humusce affectûs visceribus otiosè inhærens aut excrementitiis quibusdam succis involutum & implicatum vehementi quasi turbine concitat *G*. Sic non nunquàm accidit ut qui variolarum, aut pestilentis cuiusdam febris seminium intûs gerit, funeri cuidam obviis factus, atque indè metu percussus, non multò post in eundem morbum incidat: huc accedit prava aeris indoles salibus nimirum volatilibus fieri, qui humores permeando, sulphura sanguinis ita exagitat ut ab iis se se extricare incipiant sales falso-acres, & tandem se se prodat variolarum seminum, certè à parentibus traductum: variolas enim in morbis hereditariis rectè annumeres, cum nulla alia, si res accuratè expendatur, earum communis causâ statui posse videatur *H*. Fermentum itaque istud, causâ externâ statim excitatum, reliquas circum euntium humorum particulas, ad aliquis turgescentiæ gradum evehit, unde febris adoritur, tùmque sanguis suis vasis cæstans, quieto ut antea circuitu ferri non potest; sed sibi ipse obices faciendo, in angustiis tubulis hæret, glandulas infarcit; ac eâ ratione, singularum quibus constat partium motus intestinus augetur, adeoque febris incendium fovetur, donec heterogeneæ particulæ, critico quodam motu ab aliis segregatæ extra vasa ferantur, ad angustos extremæ cutis poros devolvantur, tandemque in dies auctæ, primò quidem maculas, dein pustulas, ac demum exiguos abscessus prognerent.

I I I.

**S**I Pustulæ illæ faciliè, aut levi labore, ut plerumque fit, erumpant, totum certè morbi negotium naturæ committendum, secus, huic auxiliari dum contendis, sæpe ita

*A* David Hamilton con de febr. mit liari.  
*B* David Hamilton in eodem tractatu de febr. miliar.  
*C* Hipp. 1. epid. sect. 3. agr. 2.  
*D* Vide Marti. Untzer. de luc. pestif. lib. 1. c. 10.  
*E* Johan. casp. Westphal Pathol. Dæmon.  
*F* Vide Lud. Viv. ad caput 16. lib. 11. August. de civit. Dei.  
Andr. Laurent. lib. de strum. c. 7.  
Munster. lib. 3. Cosinoge.  
Mart. Weinrich. lib. de Mounst. c. 17.  
Gregor. Horst. epit. ad Fabrit. Guillelm. Fabrit. centur. 3. Observ. 56.  
Lemm. lib. 1. Occult. cap. 4.  
Paracum lib. 24. cap. 7.  
Aventin. lib. 7. Annal.  
Jo. Math. cent. quest. 16. & 86.  
Scheuenman. in Paracels. de Peste cap. 15.  
*G* Sc. nerr. lib. de Consens. Chy. cap. 14.  
Thom. Fien. de Vir. imag. Goclen. Cosmogr. Untzer. loc. cit.  
*H* Goclen. lib. cit.  
*I* Mercur. de morb. puer lib. 1. cap. 2.

adversaris, ut plerisque jugules quos servare est animus. Has verò illorum quæ modò recensuimus Symptomatum, modo plura, modò pauciora non nunquam comitantur, magna adest spirandi difficultas, tussis violenta urget, pulmones uruntur, fauces, lingua palatum exarescunt, perturbatur cerebrum, sanguis rore suo orbatus æstuat, vasa distenta huic continendo vix sufficiunt, perspiratio præpeditur, pravorum succorum secretio retardatur, omnes humores fusque deque moventur, nec suis incerniculis se sistant, aut in iis satis commorantur ut cum humore quo imbitur in cerniculum coalescere possint; secretionum enim rationem noli pororum conformationibus, Diametrisve & partium configurationibus referre, singula corporis incernicula peculiari succo imbitur natura huic consimili quem erant pervolutura, indè bilem Hepar, Lien melancholiam, Renes serum expurgant, cujus rei fidem adjuvabit experimentum Chymicis familiare quòd Papyrus bubulam, oleo inungunt, si oleosum, vel aquà si aquosum laticem separare est animus. Humores igitur ab ingressu incerniculorum, ingenti sanguinis æstu repelluntur, & quemadmodum vigente febre intensiori inusta Pyrotica exarescunt nullamque saniem fundunt, sic profectò variolarum seminium nimia sanguinis fermentatione commotum, per cutis glandulas vix percolatur, undè fit nonnunquam, ut pustulæ antè maturationem deprimantur, aut retrogressæ evanescant, fit etiam interdum ut sales falso-acres nec partibus internis parcant, quod & multorum cadaverum apertione compertum est, in quibus jecur, Lien, pulmones, omniaque interiora, haud secùs ac cutis, sordidissimis pustulis scaterent *A*, sic pravè erumpentibus variolis, eò certè omnis tendere debet curandi modus, ut sanguis in vasis æstuans temperetur, hujus acrimonia demulceatur, siccitas diluatur, depleantur vasa turgida, fermenta innata à vinculis, sine tumultu solvantur, & per cutis spiracula secernantur. Hæc verò ne speres ab Alexipharmacis quæ tùm sanguinem jam nimis discerptum, exsiccatum & acri indole præditum, dissolvere, exsiccare, acrioremque reddere magis apta sunt, quàm eundem rescere, diluere, lenire: quod ut clariùs innotescat, animum ad ea advertamus quæ in antidotis adversùs toxica quæ iam eligendis observanda veniunt. Duò sunt potissimum toxicorum genera, sanguinem cogunt alia, discerpunt & carminant alia, ita ut etiam partes solidas vi suà causticà rodant atque depalcant. Prioris generis sunt viperæ, Tarentulæ *B* venena, quæ tamen à non nullis inter corrosiva recensentur *C*: Posterioris verò Mercurius sublimatus *D*, Arrenicum *E* &c. At his diversis venenorum generibus diversa opponuntur antidota: corrosivis quidem lenientia & diluentia, ut si quis arrenicum sumpserit, statim, iis quæ vomitum cient prius exhibitis, ei sunt præscribendæ emulsiones, pristinæ lenientes, aliaque hujusmodi quibus residui toxici acrimonia mitigetur, visceraque ægrotantis vindicentur, quin & ei aquam copiose ut bibat suadendum, quod quidem multiplici experimento comprobatum habetur, non hominum solum, sed & animantium: non nunquàm enim in fodinas arsenicales immissi sunt canes qui inde exanimis educti, statim revocabantur atque ipsis aquæ bibendæ copia *F* facta esset. Mures quoque si quando arsenico infecti aquam bibant, liberantur: huc accedit quod de vulpibus narratur, scilicet ubi amygdalas amaras degustarunt, præ insigni quam inde experiuntur corrosione interire, nisi è vestigio aquam epotent. *G* Is verò toxicis quæ sanguinem cogere apta sunt, ea adversantur antidota quæ sanguinem rescindere & dissolvere valent, ut aqua Theriacalis, confectio Alkermes, Mithridatium, Theriaca vetus, sal volatile viperæ: acria itaque toxica volatilibus, & sanguinem cogentia lenientibus dulcibusque medicamentis si quis oppugnare aggrediatur, pravam certe sanguinis diathesim adaugebit, & immedicabilem efficiet. Idem prorsus de variolarum fermento ferendum judicium. Non minùs itaque eriat qui huic morbo mederi contendit cardiacis, Alexipharmacis, apud vulgus adeo decantatis, quàm qui corrosivum arrenici venenum atcere, aut lenire sulciperet Orvietano, Mithridatio, Theriacà, aliisque hujus generis, quæ potentium toxicorum sales falso-acres acere, vimque causticam intendere summo-

*A* Mercurial. de  
Morb. Puer. cap. 1.  
Fernel. de  
Morb. pestilent  
lib. 2. cap. 12.

*B* Georg. Bagl.  
diff. de Tarent.  
cap. 8.  
*C* Joan. Linder  
de Venenis.  
*D* Vide Exerc.  
cit. Med. curs.  
de Mercur. dulc.  
*E* Cardan. lib.  
de Venen.  
Sperling. diff.  
fert. de Arsenic.  
Joan. Linder lib.  
2. tit.

*F* Mercurial. de  
Morb. venen. &  
venen's cap. 9.  
de Arsenic.

*G* Plutarch. 6.  
Sympos. cap. 2.  
Mercurial. loco  
cit.



perè valent. Variolarum enim fermentum cum sit sal acre-salsum, globulos sulphureos sanguinis discerpens, cutemque ut plurimum erodens, ea sane non expositulat remedia quæ sanguinem exagitare, diffundere & dissolvere, sed quæ hunc lenire, diluere apta sint, ut sunt gelatinæ cornu cervi, emulsiones, oleum amygdalarum dulcium, quo non præstantius alterum adversus morbos ab acriori materiâ obortos remedium datur *A*, pitisanæ diluentes, quin & aqua multa, si tamen modus servetur, nam ab aquæ potatione perspirationem insensibilem præpediri non immerito admonet medicinæ staticæ luculentus author *B*, hinc aquæ potiores Rheumatismis obnoxios fere omnes videas. His tamen remediis ne ita fidas, ut sanguinis missionem, atque purgationem omnino respuas. Istis enim prudenter administratis, sanguis æstuans refrænatur, exsiccatus diluitur, spiritibus orbus reficitur, impurus defæcatur, ac tandem per cutis spiracula à fordibus liberatur.

*A* David Hamilton de praxeos Regulis. Item Zuingerus dissert. de Amygd. *B* Sanctior. Med. stat. sect. 3. Aph. 67. Vide etiam Jeane Freind cœmœnolog. cap. 3.

I V.

**A**PHLEBOTOMIA hæc omnia bona derivari, cum in nimio erumpentium variolarum æstu, sibi metipsis obicem facientium ritè instituitur, nemo est qui inficias ire audeat, nisi præjudiciis captus, aut in morborum observatione & curatione omnino insolens. Ingens ille sanguinis æstus, qui etiam dum erumpunt variolæ non nunquam contingit *C*, nil aliud est quàm hujus expansio nimia, eaque tanta interdum ut perstrictos partium meatus circum eundo viam sibi præcludat liquor, nihil autem citius tutiusque huic expansioni nimix, atque inde nascituris vel jam enatis tot Symptomatis occurrere aut mederi potest, quàm ipsa redundantis sanguinis minutio. Prava fermenta à compedibus partium sulphurearum expediti non possunt, cum vasa sanguine ita opplentur ut huic continendo paria esse vix possint, phlebotomia verò vasa nimis repleta deplet, adeoque perspirationi favet *D*, & semini variolarum secretionem promovet, eadem prorsus ratione ac scabiei, erysipelatis, aliorumque morborum cutem infestantium, materiam foras amandari ejusdem phlebotomiæ auxilio quotitè videmus: quin adeo Juvatur à phlebotomiâ, motus & expulsio humoris ad superficiem corporis, ut sæpe eadem die, quâ secatur vena in acutis febribus, imò paucis interdum à sectione horis, copiosos sudores, eosque criticos ac salutare erumpere conspiciamus. Nec mirum sane id videri debet cum venæ sectio efficiat ut qui prior fluit sanguis, ei qui proxime sequitur minori sit impedimento: E tum enim necesse est uberius à corde rivus profundatur, atque partes internæ antea sanguine impeditæ leventur, suæque munia expeditius obeant, unde & felicior humorum secretio & transpiratio. Certe nil magis, dùm furit sanguis, duram meningem unde cordis motus *F*, atque adeo sanguinis circuitus, proindeque & transpiratio exoritur, onere quo tunc premitur, magis liberat, quàm phlebotomia. Nullum præterea adversus peripneumoniam majus præsidium compertum est, quàm venæ sectio, cujus ope sanguis à centro ad corporis ambitum, in hoc affectu mirabiliter excitari deprehenditur, quid ni & idem in variolis prestare interdum poterit eadem sanguinis missio? præsertim cum pulmonum inflammatione sæpe laborent variolis correpti *G*. In Rheumatismo item, ubi diaphoresis tantopere exoptanda, nullâ re magis id commodi quàm missio sanguine conciliatur *H*, quid ni & in variolis etiam erumpentibus, si eadem intercipiatur, idem contingeret? Phlebotomiam, cum ante eruptionem variolarum celebratur, transpirationi sæpe ita conducere, ut qui intus latebat humor mox cutem totam inficiat, negaverit nemo; cur iisdem præ ferociori sanguine sentiens erumpentibus moras necret Phlebotomia? Præterea ad venenatorum quorundam animalium, ut scorpionis, aut rabidi canis, virus, si quando vulnere exceptum est, foras propulsandum, plurimum valere venæ sectionem experientia testatur *I*: Cur ergo alli variolarum fermentum ad cutis regionem propulsatum, atque inde nimia fermentatione, jam penè retrocedens, foras non ager? Sanguinem etiam dilutiorem reddat sanguinis minutio necesse est, cum ea vasa relaxet quæ ob nimiam sui tensionem serum elargiri vix poterant, hac enim remissione sit ut capsula

Vide *C* Anton. Merind. de Febr. cap. ultum. *J*oann. Chicor. de Morbillor. & variolar. ortu, causis & curatione, ad Theodor. epistol. *L*az. River. de pestil. febr. cap. 2. de variol. & morbill. *D* Merind. Chicor. River. locis jam citatis, *E* Bellin. sang. mist. *F* Georg. Bagl. de fibr. mot. specim. lib. 1. cap. 5. *G* River. *H* Jc. Cartier. de Rheumat. c. 8. *J*oann. Chicor. de Rheumat. cap. 3. & sequ. *I* Cels. lib. 5. cap. 27. art. 5. edit. Alin. Juvenc. Vide quest. med. Parvus in Schol. Med. de fe. Alin. die 11. Maii 1702. an variolis diaphor. Vide etiam Zuing. Pr. x. Med. in Hydroph.

atrabiliaria quæ feri portionem excernunt, eamque in venas emulgentes traducunt, quâ exsuccum sanguinem è renibus reducem diluunt, suo demum munere fungantur. Sic lymphæ à sanguine segregata facilius in venam subclaviam transfunditur ac sanguinem è partibus reducem irrorat. Sic è cerebro rediens sanguis humescit serò quod in glandulis conglobatis duræ meningis secernitur *A*, & in ventriculis cerebri collectum labitur per infundibulum in spongiosam glandulæ pituitariæ substantiam, indeque per peculiare ductus in venam jugularem traducitur, adeo ut Phlebotomiæ auxilio, serum in variolis, ob febris sævitiam, suis vasibus retentum, restituatur sanguini, hunc diluat, ejusque acorem deliniat. Spiritibus etiam tunc fovendis, tunc resarciendis Phlebotomia opportunè celebrata confert non parùm, sanguine enim, in variolis seu erupturis, seu tandem erumpentibus, ita dissoluto & commoto ut arteriæ ultrà quàm par est distendantur, nervorum qui his ubique interferruntur, non potest non valida esse compressio, hac autem compressione necesse est aut intercepti spiritus, aut saltem minori copiâ secerni; *B* ita ut ingruat dyspnœa, obstruatur animi vigor, & pro ratione momenti quo nervi premuntur, succedat aut stupor, aut somnolentia, aut somnus profundus: non secus ac vino liberis epoto sequi solet. Sed quod lethalius est, interceptis spiritibus imminuuntur vires quibus deficientibus, variolarum eruptio fieri, aut absolvi nequit: at Phlebotomia, sanguinem minuendo, his omnibus aut medetur aut occurrit, adeoque spirituum conservationi & secretioni mirabiliter conducit, variolarumque eruptionem non medio-crius promover. Tantâ interdum sanguinis copiâ, dùm erumpunt variolæ, inflantur vasa cerebri, ut non solum spirituum canaliculos, tractusque medullares suâ distensione angustent, sed etiam ipsa disrumpantur, sanguinemque in cerebri substantiam effundant, & ineluctabilem pariant apoplexiam *C*, præsertim si ægrotantes obesiori sint habitu, cui sanè malo occurrere nil felicius potest quam ipsa sanguinis detractio, modò tamen maligni adeò moris non sint variolæ, ut humanum non sit ab earum insidiis præcavere. Cum igitur, etiam erumpentibus variolis, ingens adest vasorum plenitudo, quæ ipsorum vim in fluida exeri non patiatur, tunc certe sanguinem mittere venâ festâ expedit, ut natura, parte oneris quo premebatur levata, quod superest liberius expellat. *D* Id remediî genus quantæ sit in his à plethorâ ortis affectibus efficaciac, præter rationem & peritiorum in arte Medicâ virorum testimonia *E*, quæ nimium variolarum, etiam erumpentium, æstum, alio remedio nec securius nec citius castigari docent, experimentum frequens confirmat, necnon & ipsa natura indicat, quæ spontaneo sanguinis profluvio utiliter plerumque invariolis & morbillis etiam erumpentibus, usa est. *F* Neque quis dicat plurimos, vel sævioribus erumpentium variolarum symptomatis conflictatos, ne punctâ quidem venâ nihilominus convalescisse, robori enim naturæ tunc habendas esse gratias ille sciat, non crudelissimæ arti, quæ dùm pretioso, ut vocant, vitæ thesauro parcere videtur, ægrotos sæpe ne ferro vulneret, sanguine præfocat, in eosque quo magis miscere videtur, eò sævit acerbis. Absit vero atrocibus eorum præceptis morem geramus, qui sanguinem humanum adeo vilem habent, ut ad omnes quoscumque, cum variolarum, tum cæterorum morborum casus, non frequenter modo, sed & copiose fundendum esse prædicent, quin imò & tantum in eo mittendo, securitatis esse contendunt, ut vel totus sine ullo vitæ discrimine tolli posse clamitent. Quod si stupeas, corpore sanguinis vacuo æque fere pulsare cor hilares reponunt, quasi verò donec ultimum illud moriens movetur, nihil sit quod à sanguine profundendo detertere debeat: Quas sanè non medentium sed furentium voces, haud immerito exhorrescunt omnes Medicorum Scholæ. Eo certè consilio, in prædictis erumpentium Variolarum symptomatis, sanguis mittitur, ut debita partibus inflammatis, nimium quæ tensis laxitas procuretur, atque inde vi suâ elasticâ, & motibus oscillatoriis restitutis, agere in liquores facilius & placidiùs possint: at certè sanguinem, si manu profusiori mittas, flaccescunt vasa, neque erunt motibus suis obeundis idonea *G*, præterea in quemnam liquorem

*A* Ant. Pachioni, dissert. epistol. de glandulis conglob. duræ Mening.

*B* Vide Joh. Freind. cinnemolog. c. 12.

*C* Joh. Jacob. Wepfer. histor. apoplecticur.

*D* Ant. Merindol. de febris. cap. ult. River. de variol. Mercurial. de morbo. pueror. cap. de variol.

*E* Avicenn. lib. 4. feb. 1. tract. 4.

6. 10. init.

Rhasis 3. cont.

tract. 13. cap. 1.

Mercurian.

comm. in cit. avicenn.

text.

Amat. Lufit.

cent. 3.

Mercurial. de morbo. pueror. lib.

1. c. 1. versùs finem.

Mercurius lib. 7.

de febris. ad finem & lib. 2. de morbo. pueror.

c. 22.

Schenck. lib. 6.

observ. med. obs.

106. & 107.

*F* Vide quæ-

stionem med. in

omnis morbus à

coagulatione M.

Dionysii Dodart

Præfide, discollæ

Parisiis in Schol.

medicor. die 12.

Novemb. 1703.]

Vide etiam de

legitimo Phlebo-

tomie usu Joh.

Freind. cinnem-

olog. c. X1.

*G* Godefr. Bidloo

exercit. anatomic.

Chir. decad. 1.

Mart. Lufit. dis-

sert. de humor.

cap. 50.

vim suam, si quæ nihilominus supersit, exerent, si sint inanita? Demum è sanguine eruuntur spiritus animales, at si desit sanguis, unde nam haurientur spiritus illi, omnium certè functionum opifices? iis enim ne credas apud quos *A* spiritus animales tanquam humani ingenii figmenta habentur, quorum certè præjudicata opinio à peritissimo in re anatomicâ vito, quam plurimis iisque validis argumentis facile refellitur *B*. Suus est igitur phlebotomiæ modus, sui sunt certi fines, quos ultra citraque nequit recta medendi ratio consistere: hos si transcendis vires dissolvis, et si ses impedis, secretiones moraris, quin & spiritus calidumque nativum deprædatis, sine quibus ea quæ tantopere, cum in omnibus morbis, tum præsertim in Variolis, fovenda est, ventriculi digestio, profus aboletur; sive enim chyli confectio ab unâ trituratione pendeat, quæ certe fabula est *C*, sive à salivali succo, aliis que non nullis, quod rationi & experientiz congruit, nulla profectò sine spirituum animalium influxu, fieri posse intelligitur. Tanta est nonnunquam, etiam dum erumpunt Variolæ, morbi ferocitas, ut venæ sectionibus ritè prudenterque iteratis, non ita cedat, aut cessura videatur, quin purgationis opem exposculet: idque certè toties contingit, quoties ingens quædam cacochymia primas vias tener, orgasmoque concitantur humores, tum enim ad fermentum variolarum crassioribus sordibus tanquam visco adhærens, evolvendum, potio purgans tutò feliciterque exhibetur, non solum iis medicamentis constans quæ deorsum, sed & iis non nunquam quæ sursum noxios humores propellunt, purgatio namque sordes sanguinis educit quibus fermentum variolarum ita implicitum tenetur ut ad cutem ferri vix possit, adeoque hoc eodem præsidio, quo humores ab ambitu ad centrum avocari vulgò putantur, facilius fit per cutis spiracula residui fermenti excretio, præterea licet purgans multos trahat humores ad partes internas, eas tamen ibi morari cum non sinat sed fortius tradat, necesse est quam plurima arceat aut avertat symptomata tum erupturis tum erumpentibus Variolis, haud aliâ ratione supervenientia, quam quòd agrotantium sanguis majori sordium copiâ inquinatur, quæ ejus fermentationem intendunt. Medicamenta purgantia non solum stimulis pollent quibus intestina vellicant, sed in ipsum sanguinem ingreditur, cuius crassum non mediocriter immutant *D*, quin & ipsius circuitum redintegrant si opportunè exhibeantur, ea scilicet removendo quæ vasa obturant, adeo ut transpirationi non mediocriter conducant, quare qui purgantur facile læduntur ab aere frigido: humorum namque pars tenuior quæ tum ad cutem copiosius fertur, retrocedere cogitur, tanta denique est purgantium, tum præsertim quæ sursum agunt, ad humores etiam per cutis spiracula excernendos vis & potestas, ut quibusdam in morbis non aliâ ratione quam ad sudores promovendos à non nullis medicis, quod certe feliciter succedit, exhibeantur *E*.

## V.

**I**DEO forsan à phlebotomiâ & purgatione, in Variolis seu eruptoris seu erumpentibus instituendâ abstinere, quòd in febribus pestilentibus, quarum naturam eandem esse ac Variolarum opinantur non nulli, neutrum unquam præfuisse, quin imò maximum inde damnum semper esse consecutum, innumera testantur exempla *F*. Verùm nec te tot exempla, sumorumque in re medica Virorum testimonia moveant, discrepant enim non parùm à pestilentibus febribus Variolæ. Hæ à salibus acribus salsis in corpore jam ab ipsis primâ explicatione delitescunt, sanguinem quæ deinde afficientibus, originem ducunt suam, illæ vero à subtili quodam inquinamento aeri insperso, quod statim & primario spiritus labefactat *G*: spiritibus autem prave affectis, certe neque phlebotomia quæ sanguinem, neque purgatio quæ humores, fed alexipharmaca quæ spiritus primò attingunt convenire jure merito videntur. Fortè etiam Variolarum, eâ quâ diximus ratione prave erumpentium, crudus qui tum semper necessariò existit humor, ab instituendâ purgatione tuum animam avertet, sed artis usu animadversum esse memineris, crudioris ejusdem quæ turgescens humoris purgatione, ancipitem periculosum quæ morbum, tutum

*A* Barbat. de sang. ejusque sero. Harvæus ad Riolan.  
*Constringit & ali non nulli.*

*B* Philip. Werheym, de Supplicat. anatomic.

*C* Mémoire sur la cause de la digestion des aliments, par M. Astruc.  
Vide & Mart. Lister, de humor. cap. 17.  
Joh. contr. Brunner, de lymph & pancreatis usu cap. 4.  
Mart Polill triomfo de gli acidi. c. 39.

*D* Vide Aristot. Problem. sect. 1. Probl. 43.  
Fernel de purg. cap. 6.  
Joh. Freind. emenolog. c. 11.

*E* Enchiridion of fev. & incident to Scamen: c'est-à-dire, traité abrégé des Fièvres qui arrivent aux gens de mer pendant l'Esté sur la Méditerranée, par Thomas Bates, & Landré.

*F* Parvus lib. 1. c. de peste. cap. 24. 1. 1. an. 1566.  
*G* in Parisius funestæ admodum sævire pestilens febris, omnes hac febre correptos quibuslibet aliter sanguis missus est, deterius inde habuisse tandemque interitile, reliquos quibus solum Alexiteria pro-

visum est, fere  
omnes evasisse.

Referunt etiam  
annales an. 1. 10.  
pestilentem fe-  
brem in galliâ  
crudeliter sevisse,  
ad quam proflig-  
andam quibus se-  
cta vena fuit, vel  
alvus ducta, omnes  
multo citius inte-  
riisse. Untzer de  
lue pestifera lib. 3.  
cap. 1.

Scribit Guillelmus  
Fabr t. cent. 4. ob-  
serv. 22. in pestilenti febre lausanen-  
si, eorum quibus secta fuit vena convaluisse neminem.

Guinerius Andernacus quoque testatur in lib. de pest. vena sectionem in pestilenti febre, suo tempore, Parisiis grassante, ita exitiosam fuisse, ut ii omnes quibus sanguis missus est, extinui fuerint.

Fallopia hircus prodidit omnes quibus ab an. 16. 4. usque ad 16. 10. in malignis febris vena secta fuerat, periisse, eorum autem qui Phlebotomiam non sunt experti quam plurimos convaluisse.

P. Salus de febr. pestil. cap. 21. observat, quia artem Medicam. an. 1. 08. & 1529. profitebantur, uno ore omnes asseruisse, ne-  
mini tum, in febre malignâ sevientem, non letuisse: aut fuisse vena sectionem.

Petr. Forestus lib. 6. observ. 9. refert in peste Delphensi anno 1557. grassante, eos omnes quibus post horas 12. secta fuisset vena  
è vivis excessisse.

Roder. Roscoe de sanitate tuenda, c. 27. ex quamplurimis quos malignâ febre curaverat, longe plures mortuos esse fatetur quibus  
sanguis missus fuerat.

Joh. Bokelius 1. part. Regim. cap. 9. asserit se experientia didicisse in pestilentibus febribus, purgationes nullatenus conferri.

G. Fernel de Morbis oculis, lib. 2. cap. 11.  
H. Fernel de purgat. cap. 12.

*Ergo erumpentibus variolarum ἐκθύματα, à Phlebotomia, & purgatione non semper abstinendum.*

### Domini Doctores disputaturi.

M. Joannes Gaillard

M. Mathæus Donisius Four-  
nier.

M. Carolus Thuillier.

M. Carolus Sompert.

M. Nicolaus Andry Lector  
Professor Regius & Praef.

M. Claudius Dufresne

M. Bertin. Simon Dieuxièvre.

M. Joannes Baudin Serenissimæ  
Delphinae medicus Prima-  
rius.

M. Guido Erasmus Emmeret.

Proponebat Parisiis HENRICUS BESNIER Parisinus,  
Baccalaureus Medicus. A. R. S. H. 1712.

Apud Viduam Francisci Muguet, Regis & Facultatis Medicinæ Typog. 1712.